

క్యాబేజి

శీతాకాలంలో సాగుచేసే కూరగాయలలో క్యాబేజి చాలా ముఖ్యమైనది. క్యాబేజిని కూరగాయగానే కాకుండా సలాంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. క్యాబేజి ఆస్తమా నివారణకు ఉపయోగపడును, ఎముకలకు మంచిది. ఊపిరితిత్తులు, పేగు క్యాస్టర్సు నయంచేయు గుణం కలదు. క్యాబేజిలో విటమిన్-బి, కె మరియు సి కలవు. అంతే కాకుండా భాస్వరం, మెగ్నిషియం, క్యాల్యూయం, మాంగస్టెన్, సెలీనియం మరియు ఇసుము మొదలగు ఖనిజ లవణాలు కలవు.

వాతావరణం: క్యాబేజికి చల్లని తేమగల వాతావరణం అత్యంత అవసరం. పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 30° సెం. మించకుండా ఉంటే ఎక్కువ దిగుబడినిస్తుంది. రబీ సీజన్లలో బాగా పెరుగుతుంది.

నేలలు: చోడు, క్షూర నేలలు పనికిరావు. ఇసుకతో గూడిన బంకనేలలు, రబీలో ముందుగా వేసే పంటలకు అనుకూలం. సారవంతమైన గుల్ల, ఒండ్ర నేలలు అధిక దిగుబడినిస్తాయి. ఉదిజని సూచిక 5.5 నుండి 6.5 గల నేలలు మిక్కిలి అనుకూలం.

విత్తనం, విత్తనశుద్ధి, విత్తనమొత్తాదు: ఒక ఎకరా విత్తుకోవడానికి సూటి రకాలకు 300 గ్రా. మరియు హైబ్రిడ్సుకు 100-150 గ్రా.ల విత్తనం సరిపోతుంది. కిలో విత్తనానికి 3 గ్రా. ఛైరమ్సు కలిపి విత్తనశుద్ధి చేయాలి.

రకాలు:

గోల్డెన్ ఏకర్: దీనిగడ్డ గట్టిగా, గుండ్రంగా, 1.0 నుండి 1.5 కిలో బరువు వుండి బుతువులో ముందుగా వేయుటకు అనుకూలమైనది. గడ్డ పగులుట నివారించడానికి కోతకు సిద్ధమైన వెంటనే కోసుకోవాలి. 60 నుండి 65 రోజులలో కోతకు వస్తుంది. మొక్కలు గుబురుగా ఉండి, చిన్నగా ఉంటాయి. కాండం పొట్టిగా ఉండి కొన్ని ఆకులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఆకులు దొపు ఆకారంలో ఉంటాయి.

ఎల్లీ డ్రమ్ పోడ్: గడ్డ చదునుగా పెద్దదిగా ఉంటుంది. 60 నుండి 70 రోజులలో త్వరగా కోతకు వచ్చే రకం.

ప్రైస్ ఆఫ్ ఇండియా: గడ్డలు గుండ్రంగా ఉండి 1.5 నుండి 2.0 కిలోల బరువుంటాయి. 60-80 రోజులలో కోతకు వస్తాయి. ఇది త్వరగా కోతకు వచ్చే రకం.

హరిరాణిగోల్ మరియు గణేశ్ గోల్: ఇవి ఎఫ్ 1 హైబ్రిడ్ రకాలు. గడ్డ గట్టిగా ఉండి 85-90 రోజులల్లో తయారవుతుంది. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి.

లేట్ డ్రమ్ పోడ్: గడ్డలు పెద్దగా గుండ్రంగా వుంటాయి. 100-120 రోజులలో కోతకు వస్తాయి. దీర్ఘకాలిక రకం.

పూస డ్రమ్ పోడ్: గడ్డ గట్టిగా చదునుగా ఉంటుంది. మధ్యకాలిక రకం, నల్లకుళ్ళ తెగులును తట్టుకొంటుంది.

పూసముక్క (సెలక్షన్-8): గడ్డ గట్టిగా చదునుగా ఉంటుంది. ఒక్కు గడ్డ 1.5-2 కిలోల బరువు ఉంటుంది. బాక్సీరియా నల్లకుళ్ళ తెగులును తట్టుకుంటుంది. నల్లకుళ్ళ తెగులు సమస్య ఉన్న ప్రాంతాల్లో నాటుకోవటానికి అనువైనది.

హైబ్రిడ్: బి.యన్.యన్.-150 మరియు బి.యన్.యన్.-126, మహికో మరియు ఇండోఆమెరికన్, నామ్ఫారి హైబ్రిడ్ రకాలు. (నాథ్ లక్ష్మి-401, గ్రీన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, సోనా, శ్వేత, అవంతి, గ్రీన్ ఛాలెంజర్, గ్రీన్బోయ్), మీనాష్.

నాటుకునే కాలం: స్వల్ప కాలిక రకాలను ఆగష్టు రెండవ పక్కం నుండి సెప్టెంబరు చివరి వరకు, దీర్ఘకాలిక రకాలను అక్షోబర్ మొదటి పక్కం నుండి నవంబరు చివరి వరకు నాటుకోవచ్చు.

నారుమడి: నేల అదునుకు వచ్చే వరకు 4-5 సార్లు బాగా దున్నాలి. 100 చ.మీ. విస్తరంలో 25-30 గంపల పశువుల ఎరువు వేసి కలియదున్నాలి. 10-15 సెం.మీ. ఎత్తు, 4 మీ. పొడవు మరియు 1మీ. వెడల్పుతో నారుమళ్ళు తయారు చేయాలి. విత్తనాలను సన్నని ఇసుకతో గాని లేక కంపోస్టుతోగాని కలిపి నారుడిలోని వరుసల్లో పలుచగా వేయాలి. విత్తిన మడిని ఎందు ఆకులతో కప్పాలి. విత్తనాలు మొలిచే వరకు (సుమారు వారం రోజుల వరకు) ప్రతి రోజు నీటిని పోయాలి. మొక్కలు మొలకెత్తిన తర్వాత ఎండిన ఆకులను తీసివేయాలి. నారుకుళ్ళ సోకకుండా లీటరు నీటికి 3 గ్రా. కాపర్ ఆక్స్ప్రోడెంటో నేలను తడపాలి.

నారుమడిని ఆకుతినే పురుగు బాగా దున్నాలి. సుమారు 10-15 రోజుల ముందు నేలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నాటటం: నేలను అదును వచ్చేవరకు బాగా దున్నాలి. సుమారు 10-15 రోజుల ముందు నేలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. దీర్ఘకాలిక రకాలకు 60×45 సెం.మీ., స్వల్పకాలిక రకాలకు 45×45 సెం.మీ. దసారాన్ని ఉంచాలి. 25-30 రోజుల వయస్సుగల నారును జాగ్రత్తగా నాటుకోవాలి. నాటే ముందు తడిని ఇవ్వాలి. ప్రొఫ్లేలలో నాటుకొని కూడా నాటుకోవచ్చు.

నీటియాజమాన్యం: తేలిక నేలల్లో వారం రోజులకు ఒకసారి, బరువైన నేలల్లో 10 రోజులకు ఒకసారి (5-6 సెం.మీ.) నీటి తడిని ఇవ్వాలి.

ఎరువులు: తోలి దఫాగా ఎకరాకు 8-10 టన్నుల పశువుల ఎరువుతో బాటు 32-40 కిలోల భాస్వరం. 40 కిలోల పొట్టాష్ ఎరువులను చివరి దుక్కిలో వేసి బాగా కలియదున్నాలి. 24-32 కిలోల నత్రజనిని 3 దఫాలుగా నాటిన 25-30 రోజులకు మొదటిసారి, 50-60 రోజులకు రెండవసారి, దీర్ఘకాలిక రకాలయితే 75-80 రోజులకు మూడవసారి వేయాలి. ఎరువులు వేసిన వెంటనే నీటిని ఇవ్వాలి.

కలుపు నివారణ, అంతరకృషి: పెండిమిథాలిన్ 30% ఇ.సి. ఎకరాకు 1.25 లీ. లేదా అలాక్సోర్ 1.0 లీ. (తేలిక నేలలు), 1.2 లీ. (బరువు నేలలు) చొప్పున 200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి నాటిన 24-48 గంటల లోపు పిచికారి చేయాలి. నాటిన 20-25 రోజులప్పుడు అంతరకృషి చేయాలి.

సస్యరక్షణ:

క్యాబేజి రెక్కల పురుగు: ఈ పురుగు ఆకుల అదుగు భాగానవుండి, ఆకులను తిని నాశనం చేస్తుంది. పురుగులు ఆశించిన ఆకులు వాడి, ఎండిపోతాయి. రెక్కల పురుగులు చిన్నవిగా, ఆకుపచ్చ, గోధుమ రంగుల కలయికలో ఉండి, పొలిపోయిన తెలుపు రంగు, సన్నని ముందు రెక్కలు, పొడుగాటి వెంట్లుకలు కలిగిన వెనుక రెక్కలు కలిగి ఉంటాయి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే పైరులో ఆకులన్నీ రంధ్రాలతో ఉండి, క్యాబేజి పరిమాణం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. దీని నివారణకు ప్రతి 25 క్యాబేజి వరుసలకు 2 వరుసల చొప్పున ఆవాల మొక్కలను ఎర పంటగా వేయాలి. గుఢును నాశనం చేసేందుకు వేపగింజల ద్రావణాన్ని (5%) పిచికారి చేయాలి. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటే లీటరు నీటికి ఎసిఫేట్ 1.5 గ్రా. లేదా స్పైనోశాడ్ 0.3 మి.లీ. కలిపి కోతకు 15 రోజుల వ్యవధితో పిచికారి చేయాలి. నాటిన తరువాత 30, 45 రోజుల్లో బి.టి. మందులు 1 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేయాలి.

పేనబంక: ఆకుల అడుగుభాగాన గుంపులు గుంపులుగా చేరి రసాన్ని పీటి నష్టాన్ని కలుగచేస్తాయి. మలాధియాన్ లేదా డైమిథోయేట్ లేదా మిథ్రోల్ డెమటాన్ 2 మి.లీ. లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

నారుకుళ్ళు తెగులు: నారు మొక్కల కాండవు మొదళ్ళు మెత్రగా తయారయి, కుళ్ళి, వడిలపోయి చనిపోతాయి. దీని నివారణకు ఎత్తెన మదులపై నారును పెంచాలి. విత్తనం పలుచగా వరుసల్లో వేయాలి. ఎక్కువ నీటి తడులను ఇవ్వరాదు. నారు మొలిచిన తర్వాత కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి కలిపి 10 రోజుల వ్యవధితో 2 సార్లు పిచికారి చేయాలి.

నల్లకుళ్ళు తెగులు: ఈ తెగులు పంట ఏ దశలో అయినా ఆశించవచ్చు. ఆకులు పత్రహరితాన్ని కోల్పోయి వి (v) ఆకారంలో ఉన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయి. ఈనెలు నల్లగా మారుతాయి. ప్రైప్టాసైల్సిన్ (1 గ్రా./10 లీటర్ల నీటికి) మందుతో విత్తనపుద్ది చేయాలి. ఇదే మందును (50 మి.గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి) నారు నాటినప్పుడు, గడ్డ తయారవుతున్నపుడు పైరుపై పిచికారి చేయాలి. కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ (3 గ్రా. ఒక లీటరు నీటికి) మందు ద్రావణంతో మొక్కల మొదళ్ళ చుట్టూ తడపాలి. ఎకరాకు 5 కిలోల బీచింగ్ శాడర్ను భూమిలో వేయాలి. ఏదైనా నూనెగింజల పంటతో 2 సం.ల పాటు పంట మార్పిడి చేయాలి.

కోత కోయటం: తగిన పరిమాణం వరకు ఎదిగిన తర్వాత కోయాలి. గట్టిగా, లేతగా వన్న గడ్డలను కోసుకోవాలి.

దిగుబడి: ఎకరాకు 14,000-16,000 కిలోల దిగుబడి వస్తుంది.

సమగ్ర సస్యరక్షణ: ఎండాకాలంలో బాగా లోతుగా దున్నాలి. పంట అయిపోయిన తరువాత మిగిలిన అవశేష భాగాలను కోసి నాశనం చేయాలి. ఎరపంటగా ఆవపంటను ప్రతి 25 వరుసలకు రెండు వరుసల చొప్పున వేసుకోవాలి. ఎకరాకు 20 చొప్పున పక్కిస్థావరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. విత్తేముందు 100 గ్రా. విత్తనానికి 2 గ్రా. చొప్పున ట్రైకోడెర్యూ కలిపి విత్తుకోవాలి. ఎకరాకు 20,000 బదనికలను విడుదల చేయాలి. 1 గ్రా. బి.టి. మందు లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి నారుమడిలో 15 రోజులకు ఒకసారి మరియు నాటిన తర్వాత రెండుసార్లు 15 రోజుల వ్యవధితో 30 మరియు 45వ రోజున పిచికారి చేయాలి. 5% వేపగింజల ద్రావణాన్ని మొదటి 30-45 రోజులలో మాత్రమే పిచికారి చేయాలి. విత్తేముందు కార్బూండైజిమ్ 1 గ్రా. లేదా కాష్టాన్ 2 గ్రా. కిలో విత్తనానికి చొప్పున కలిపి విత్తనపుద్ది చేయాలి. మాంకోజెబ్ 3 గ్రా. లేదా కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 3 గ్రా. లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి పిచికారి చేసి క్యాబేజిలో కుళ్ళు తెగులు తగించుకోవాలి. 2 గ్రా. బెవేరియా బాసియానా లీటరు నీటికి చొప్పున కలిపి 20 రోజుల వ్యవధితో పిచికారి చేయాలి.

క్యాబేజి సాగుపై మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన చిరునామా
సీనియర్ సైంటిస్ట్ (హోర్టికల్చర్) మరియు పోడ్, ఉద్యాన పరిశోధనా సానం,
అదిలాబాద్ 504001. ఫోన్: 08732-220458.